


# #HERBE&FOURRAGES

## CLIMATOLOGIE


	Températures cumulées 2023 (en °C depuis le 01/01)	Pluie cumulée 2023 (en mm)	Pluie sur 10 jours (en mm)
Charleville	637	306	31
Linay	649	257	26
Montcheutin	685	183	21
Rocroi	542	403	43
Saulces-Champenoises	695	160	19



Avec des pluies régulières, des températures douces et une durée du jour qui augmente, les conditions sont idéales pour la pousse de l'herbe et une avancée rapide en stade.

Des pluies sont annoncées dans les prochains jours et risquent de compliquer les premières fauches.

## SUIVI DE LA POUSSE




La pousse de l'herbe a explosé cette semaine avec une moyenne de 70 kg MS/ha/j sur le département, et certaines parcelles atteignent des hauteurs bonnes à faucher notamment dans les prairies temporaires. En pâturage tournant, la pousse dépasse la consommation. Certaines surfaces sont « débrayées » c'est-à-dire qu'elles sont réservées à la fauche.

## POINT DE SITUATION

### QUIZ

La plante du quiz de la semaine dernière est la cardamine des prés. On la rencontre fréquemment dans les Ardennes.

Les épis montent dans les gaines, le stade 2 nœuds était atteint ce lundi dans plusieurs secteurs. L'épiaison pourrait intervenir dans les jours à venir dans les secteurs les plus avancés. Les premières fauches peuvent démarrer si les conditions météo le permettent.



Fauche des graminées en fonction du stade de développement. Source : Herb'actifs

### CONSEILS DE LA SEMAINE

Pour les parcelles de pâturage, il faut le premier tour de pâturage sous peu pour éviter les hauteurs d'herbe moins appétentes et de moindre qualité qui induisent souvent des refus. En pâturage tournant, n'hésitez pas à subdiviser des parcelles pour les faucher partiellement si vous avez trop d'herbe disponible.

Dans les parcelles destinées à la fauche, le déprimaie est terminé. En fauche précoce, surveillez quotidiennement le stade des graminées en observant la montée des épis dans les gaines (fendre la gaine dans le sens de la hauteur) :

- les ensilages peuvent être réalisés jusque quelques jours avant épiaison
- les enrubannages sont réalisés à début épiaison (10% des épis sont visibles)
- les foins sont réalisés à pleine épiaison (50% des épis sont visibles)

Pour rappel, la qualité alimentaire diminue tout au long de la croissance de la plante. Les graminées perdent beaucoup en MAT dès montaison et perdent progressivement en UF. Si la qualité nutritive est votre priorité, le stade des graminées est votre critère de décision principal. Si vous avez aussi un objectif de quantité, cherchez le compromis entre stade et hauteur d'herbe.

En privilégiant la fauche précoce, on permet des repousses plus importantes sur le printemps tant que les conditions météo sont réunies. Pour les prairies permanentes ou les temporaires de longue durée sur lesquelles on souhaite favoriser une flore variée, pensez à alterner les modes et dates de récoltes. Les prairies à flores diversifiées sont aussi celles dont les valeurs nutritives se maintiennent sur une période plus longue. **Si vous êtes contraints par le temps (qu'il fait) ou par le temps (disponible), organisez vos chantiers en fonction de la souplesse d'exploitation de vos parcelles !**

Aucun événement programmé : n'hésitez pas à nous contacter pour organiser des tours de pâtures !



**Contact : Adèle RAYNAUD**  
 Conseillère Herbe & Fourrages  
 Chambre d'Agriculture des Ardennes  
 03 24 36 64 52 – 07 52 63 75 87  
[adele.raynaud@ardennes.chambagri.fr](mailto:adele.raynaud@ardennes.chambagri.fr)

