


# #HERBE&FOURRAGES

## CLIMATOLOGIE




	Températures cumulées 2023 (en °C depuis le 01/01)	Pluie cumulée 2023 (en mm)	Pluie sur 10 jours (en mm)
Charleville	1281	382	0
Linay	1329	330	0
Montcheutin	1370	247	0
Rocroi	1157	516	0
Saulces-Champenoises	1386	241	0




Le beau temps de ces dernières semaines a permis de terminer les travaux de récoltes avec une avance de 2 semaines voire 1 mois par rapport aux années passées. Maintenant, le besoin de pluie commence à se faire sentir que ce soit dans les prairies ou les cultures.

## SUIVI DE LA POUSSE

Hauteurs d'herbe (en cm) par site



Pousse moyenne journalière des herbages ardennais  
( en kg de MS/ha/jours )



Bien que les parcelles fauchées précocement montraient jusqu'à présent de belles repousses, la végétation et la hausse des températures couplée à un vent de nord-est ont asséché les sols.

Cela a permis un meilleur séchage au sol des foins mais commence à pénaliser les repousses.

## POINT DE SITUATION



Les dernières mises en pâtures, récoltes d'ensilages/enrubannages et foins se sont enchaînées voire achevées pour certains durant cette période de beau temps.

Les qualités et quantités de foin récolté explosent et permettent de refaire du stock.

En photo : prairie permanente fraîchement fauchée.

## CONSEILS DE LA SEMAINE

Les ensilages sont terminés, les valeurs alimentaires des dernières récoltes risquent d'être décevantes au vu du stade. Une analyse du fourrage à l'ouverture du silo permettra d'ajuster les rations en fonction de la qualité.

Les foins récoltés sont peu avancés en stade, l'herbe encore bien verte commence seulement à sécher au pied. Dans ces conditions, attention à ne pas précipiter le pressage (d'autant plus en forte densité) et surveillez les risques d'échauffement pouvant induire des pertes de qualité, voire d'incendie ! En cas de doute, contrôler le taux d'humidité et la température des bottes durant les 30 jours suivant le pressage : maxi 15% d'humidité et < 45°C. Faute de sonde de température, l'odeur et l'aspect, la sensation de chaleur, l'affaissement des bottes, sont des indicateurs.

Les premières parcelles fauchées commencent à avoir des repousses suffisantes pour le pâturage : visez une hauteur d'herbe à 12-13 cm (moyenne de 8-9 cm aujourd'hui).

Dans les parcelles déjà pâturées, fauchez ou broyez les refus et valorisez-les en topping\* s'ils sont importants. Les chardons et les rumex sont en fleurs, une coupe de nettoyage peut être nécessaire.

\*topping : technique consistant à faucher l'herbe dans le paddock avant le passage des vaches

En revanche, pour les mises en pâture tardives dans des parcelles n'ayant pas été fauchées, il est judicieux de trouver un juste milieu entre faucher l'excès d'herbe et laisser du stock sur pied (même au stade avancé) pour sécuriser la saison estivale.

## EVENEMENTS A VENIR

- Voyage d'étude dans l'Aube, le 14/06 matin pour un atelier « Sainfoin et nutrition équine », **SUR INSCRIPTION**
- Animation « Améliorer mon autonomie fourragère » : partage d'expérience et recherche de solutions. Date à fixer en fonction des participants.  
Inscription au 07 52 63 75 87
- Tour de pâtures sur demande

Retrouvez nos vidéos « Herbe » sur Youtube :

<https://www.youtube.com/@chambredagriculturedesarde4486>



**Contact : Adèle RAYNAUD**

Conseillère Herbe & Fourrages

Chambre d'Agriculture des Ardennes

03 24 36 64 52 – 07 52 63 75 87

[adele.raynaud@ardennes.chambagri.fr](mailto:adele.raynaud@ardennes.chambagri.fr)

Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR  
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE  
Label AgriBio Premium

